

Överlevnad

bland tidigt födda barn (%)
i Sverige åren 2018-2022. Illustration
av överlevnad vid födelse i olika
graviditetsveckor.

Överlevnaden var högre för barn
vars mödrar erhållit kortiko-
steroider före förlossning och om
förlossning skett på universitets-
sjukhus. Tillväxthämmade foster och
tvillingar/trillingar hade sämre
chanser.

De flesta barn som avled gjorde det
tidigt och om barnet levde 24 timmar
efter födelsen så var överlevnaden
klart högre än de procenttal som
anges i figuren.

Källa: Årsrapport 2022 för
Neonatalvårdsregistret SNQ.

22⁰-22⁶ veckor: 45%



23⁰-23⁶ veckor: 66%



24⁰-24⁶ veckor: 71%



25⁰ - 25⁶ veckor: 86%



6½-årsuppföljning


av överlevande barn födda i Sverige
2004-2007 efter 22-26 graviditetsveckor.

Funktionshinder (definierat som måttligt eller svårt) var vanligast bland barn födda i vecka 22-23 (57%) jämfört med barn födda i vecka 25-26 (28%).


Förekomst av funktionshinder var vanligare hos barn med svåra komplikationer i nyföddhetsperioden (stor hjärnblödning, svår kronisk lungsjukdom, infektion, undernäring).

Källa: EXPRESS-studien (Serenius F et al, JAMA Pediatrics 2016).


Kognitivt funktionshinder: svårt: 11% (röd), måttligt: 19% (orange)




Cerebral pares: svår: 1,1% (röd), måttlig: 2,7% (orange)



Blind/grav synnedsättning: 2%, måttlig synnedsättning: 3%



Döv/hörapparat: 0,5%, måttlig hörselnedsättning: 1,6%



6-årsuppföljning

av överlevande barn födda i Sverige
2004-2007 efter 22-26 graviditets-
veckor.


Funktionshinder definierat som:

- svårt (IQ <65 eller svår CP eller blind eller döv; röda figurer)
- måttligt (IQ = 65-77 eller måttlig CP (går med hjälpmedel) eller måttlig/korrigerbar synnedsättning eller hörselnedsättning avhjälpst med hörapparat; orangea figurer).


Prognosen försämras av svåra komplikationer i nyföddhetsperioden (stor hjärnblödning, svår kronisk lungsjukdom, infektioner, undernäring).

Källa: EXPRESS-studien (Serenius F et al, JAMA Pediatrics 2016).


22⁰-22⁶ veckor: svårt (20%) eller måttligt (40%) funktionshinder




23⁰-23⁶ veckor: svårt (22%) eller måttligt (35%) funktionshinder



24⁰-24⁶ veckor: svårt (19%) eller måttligt (21%) funktionshinder



25⁰ - 25⁶ veckor: svårt (12%) eller måttligt (18%) funktionshinder



26⁰-26⁶ veckor: svårt (9%) eller måttligt (16%) funktionshinder